

유방보존수술 치료 계획표 [입원]

PL_0112_H1_202307

구분	수술 당일		수술 후 1~2일	수술 후 3~4일
	수술 전	수술 후		퇴원(오전)
관찰 및 측정	<div><div>• 활력징후 측정 (체온, 혈압, 맥박, 호흡)</div><div>• 신장/체중 측정</div></div> <div></div>	<div><div>활력징후 측정</div></div> <div></div>	<div><div>활력징후 측정</div></div> <div></div>	<div><div>활력징후 측정</div></div> <div></div>
활동 정도	<div><div>침상안정</div></div> <div></div>	<div><div>• 침상안정</div><div>• 보호자 동반 하 화장실 이동 가능 (낙상 주의)</div></div> <div></div>	<div><div>일상생활</div></div> <div></div>	<div><div>일상생활</div></div> <div></div>
식사	<div><div>금식</div></div> <div></div>	<div><div>3시간 후 물 섭취</div></div> <div></div>	<div><div>유방수술식 밥</div></div> <div></div>	<div><div>유방수술식 밥</div></div> <div></div>
검사 및 처치	<div><div>수술 전 초음파 유도 하 위치 표시술(필요시)</div></div>	<div><div>• 수술 부위 상처 확인</div><div>• 배액관 관리(필요시)</div><div>• 조직검사(수술장에서 시행)</div></div> <div></div>	<div><div>• 수술 부위 상처 확인</div><div>• 배액관 관리(필요시)</div></div> <div></div>	<div><div>• 수술 부위 상처 확인</div><div>• 배액관 제거(회진 후 결정)</div></div> <div></div>
약물 치료	<div><div>주사 : 수액, 위보호제 항생제(수술 시작 직전)</div></div> <div></div>	<div><div>• 주사 : 수액(식이진행 시 제거), 진해거담제</div><div>• 필요시 진통제, 항구토제 투여</div></div> <div></div>	<div><div>• 경구약 : 진해거담제, 소염진통제, 소화제, 변완화제</div><div>• 필요시 진통제, 수면제, 변완화제</div></div> <div></div>	<div><div>• 경구약 : 소염진통제, 소화제, 변완화제</div><div>• 필요시 진통제, 수면제, 변완화제</div></div> <div></div>
교육 및 설명	<div><div>• 입원생활안내</div><div>• 수술 전/후 주의사항 교육</div><div>• 수술 동의서 작성</div></div> <div></div>	<div><div>수술 후 주의사항</div></div> <div></div>	<div><div>• 유방암교육(교육 일정표 참조)</div><div>• 팔운동(수술 후 2일째부터 시행)</div><div>• 퇴원준비(각종 서류 신청)</div></div> <div></div>	<div><div>• 퇴원 후 주의사항</div><div>• 퇴원약</div><div>• 외래 방문일 예약</div><div>• 퇴원 수속 절차</div></div> <div></div>

※ 상기 일정은 환자에 따라 변경될 수 있습니다.