

소아 진정 치료(주사) 시 주의사항

진정 전 주의사항

1. 음식이 정확하게 이루어지지 않으면 소아가 구토를 했을 경우 음식물이 폐로 흡인되어, 치명적인 흡인성 폐렴을 유발시킬 수 있습니다. 그러므로 **반드시 금식 시간을 지켜주셔야만 합니다.** 만약 음식이 정확하게 이루어지지 않는다면, 부득이 검사가 취소될 수 있습니다.

구 분	금식 시간
물, 노엔피오	투약 전 2시간
모유(분유 안됨)	투약 전 4시간
그 외 음식	투약 전 6시간

※ 그 외 음식 : 분유, 음료, 사탕, 껌, 이유식, 밥 등

※ 노엔피오 : 탄수화물 보충 음료 /최대용량 10cc/Kg (PET 등 당 섭취 제한 검사가 있는 경우 복용 금지)

2. **감기 증상**(고열, 심한 기침, 가래 등)이 있으면 검사가 취소될 수 있습니다. 해당 증상이 있는 경우 검사 전일 미리 연락하여 주시기 바랍니다.
3. 소아의 안전을 위해 장신구(머리핀 등)와 매니큐어는 미리 제거해 주시기 바랍니다.

진행과정

검사 1시간 전 접수(장소 :)

진정 전 평가와 동의서 구득

정맥로 확보 및 진정 약제 투약

진정 검사 시행 (해당 검사실)

회 복

퇴 실

진정 후 주의사항

1. 검사료 외 **진찰료와 마취료가 추가됩니다.**
2. 진정 검사 또는 시술 종료 후 의식 회복까지 10~30분 정도 소요됩니다. 단, 상황에 따라 회복 시간은 달라질 수 있습니다.
3. 소아가 깨어난 후에도 어지러워 비틀거릴 수 있으니, 넘어지거나 다치지 않도록 보호자의 **주의 깊은 관찰이** 필요합니다.
4. 검사 당일 귀가한 후에도 놀이, 목욕, 활동 시 주의가 필요합니다.
5. 퇴실 후 수면 중 얼굴이 파래지거나 (청색증), 호흡이 얇아지는 경우에는 가까운 응급실을 방문해 주십시오.

문의전화

- 문의전화 : 소아진정치료실
(신관 2층, 영상의학과 내)
대표번호: 1688-7575

소아
진정
안내



스마트폰의 QR 코드 리더기로
스캔하시면 소아 진정에 관한
애니메이션을 볼 수 있습니다

진정 치료의 전반적인 과정은 마취통증의학과
전문의에 의해 체계적으로 관리, 시행되고 있습니다.



서울아산병원
Asan Medical Center

서울아산병원 (우)138-736 서울특별시 송파구 올림픽로 43길 88 | 홈페이지 : www.amc.seoul.kr
병원대표전화 : 1688-7575 | 응급실 : (02) 3010-3333 | 소아응급실 : (02) 3010-1053